

## Merkblatt zur Beschneidung aus rituellen Gründen

### Sehr geehrte Familie,

Sie haben den Wunsch nach einer Beschneidung aus religiösen Gründen bei Ihrem Sohn geäußert.

Wir möchten Sie über den Ablauf der Operation in unserer Praxis, die Operationsrisiken und die mit der Operation verbundenen Kosten informieren.

In einem Beratungsgespräch wird Ihnen zusätzlich der behandelnde Arzt, nach einer kurzen körperlichen Untersuchung, das Vorgehen ausführlich erläutern.

Bei Ihnen wird eine Beschneidung durchgeführt. Hierbei wird ein Stück der Vorhaut ringförmig abgetragen. Das innere und das äußere Vorhautblatt werden wieder miteinander vernäht. Sie sehen beim sanften Zurückziehen der Vorhaut auf eine rundherum verlaufende Nahtreihe. Als Nahtmaterial werden selbstauflösende Fäden verwendet, die in den folgenden 2 Wochen von selbst abgehen werden.

Seien Sie nicht besorgt, wenn am Operationstag die empfindliche Schleimhaut der Vorhaut stark anschwillt. Denken Sie daran, wie stark z.B. die Wangenschleimhaut anschwillt, wenn Sie sich aus Versehen auf die Wange beißen. Geringe Nachblutungen aus dem Wundnahtbereich sind normal. Sie sollten jedoch nicht die Stärke von Nasenbluten erreichen.

Wenn Sie nach der Operation nach Hause kommen, versuchen Sie möglichst Ruhe zu halten. Im Liegen, legen Sie bitte den Penis nabelwärts auf Ihren Bauch. Durch diese Hochlagerung können Sie innerhalb gewisser Grenzen einer stärkeren Schwellung vorbeugen.

Das Wasser lassen sollte ohne Probleme gelingen. Bei Kindern kann es aber sein, dass der Urin aus Angst zurückgehalten wird. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie das Kind in eine Wanne mit warmem Wasser ohne Badezusätze und lassen es darin urinieren.

Nach jedem Wasserlassen legen Sie bitte erneut einen Schutzverband an. Hierzu geben Sie von der verschriebenen Salbe auf eine Mullkompressen und legen sie auf die Wunde und die Eichel. Achten Sie darauf, dass diese immer gut eingecremt ist.

Durch den Verband lässt sich vermeiden, dass die Unterwäsche verschmutzt wird. Tragen Sie enganliegende Unterhosen, die eine feste Lagerung des Penis auf dem Unterbauch erleichtern. Trinken Sie bitte viel, so vermeiden Sie Schmerzen beim Wasserlassen, die sonst durch zu hohe Urinkonzentration auftreten können.

In den meisten Fällen wird nach 2-3 Tagen die Schwellung deutlich zurückgehen. Sollten wider Erwarten starke Schwellungszustände bestehen bleiben oder eine Blaufärbung mit Ausbildung eines Blutergusses am Penisschaft eintreten, so rufen Sie bitte unsere **Praxis-Rufnummer 0202-24 80 60** an. Außerhalb der Sprechzeiten werden Sie durch zusätzliches Wählen der 21 mit unserem 24 h Rufdienst verbunden.

Sollte ausnahmsweise keiner zu erreichen sein, empfehlen wir das Aufsuchen der Urologie im Helios Klinik Schwelm, Dr.-Moeller-Straße 15, 58332 Schwelm  
Urologische Ambulanz, Telefon: 02336-481336 oder 02336-480.

**Ihr Praxisteam**

## OPERATIONSAUFKLÄRUNG PHIMOSE

### Sehr geehrte Familie

Bei Ihrem Sohn ist die Durchführung einer Circumcision (Beschneidung, Entfernung der Vorhaut) geplant.

Dieser Eingriff wird bei Kindern in Vollnarkose durchgeführt. Zusätzlich werden an der Peniswurzel während der Operation, ähnlich wie bei einer Zahnwurzelbetäubung, durch Einspritzen einer geringen Menge eines örtlichen Betäubungsmittels die Nerven betäubt, die den Schmerz von der Penisspitze leiten.

Risiken bei der Operation sind:

- Beim Setzen dieser örtlichen Betäubung kann ein kleines Gefäß getroffen werden, so dass später ein kleiner Bluterguß an der Peniswurzel entsteht, der jedoch überhaupt nicht behandlungsbedürftig ist.
- Beim Einspritzen des örtlichen Betäubungsmittels kann es zu einer allergischen Reaktion kommen. Teilen Sie uns daher unbedingt mit, wenn es früher bereits zu Problemen bei der Gabe von örtlichen Betäubungsmitteln, z.B. beim Zahnarzt gekommen ist.
- Blutung und Nachblutung; wie bei allen Operationen können kleinste Gefäße trotz intraoperativer Blutstillung später erneut anfangen zu bluten.
- Blutverdünnende Medikamente (Marcumar, Aspirin, Ass, Ticlid etc.) dürfen, ggf. nach Rücksprache mit uns und Ihrem Hausarzt einige Tage vor dem kleinen Eingriff nicht mehr eingenommen werden.
- Infektion; jede Wunde kann sich trotz sorgfältiger Desinfektion infizieren. Erfahrungsgemäß ist dieses Risiko im Vorhautbereich sehr gering.
- Narbige Engstelle; durch Schrumpfen der Wundränder und Ausprägung einer starren Narbe kann es manchmal erneut zur Ausbildung eines engen Vorhautringes führen, der das komplette Zurückstreifen der Vorhaut verhindert.
- Nach der Operation ist die Eichel zunächst sehr empfindlich, da sie nicht mehr so durch eine darrüberliegende Vorhaut geschützt ist. Dieses Überempfindlichkeitsgefühl bildet sich spontan schnell zurück.
- Zu der Operation gehört die Durchtrennung des kleinen Vorhautbändchens, das die Vorhaut an der Harnröhrenmündung unten festhält. Hier kann nach der Operation die Wundheilung etwas verzögert ablaufen.
- In seltenen Fällen kommt es zur Ausbildung einer Enge im Bereich der Harnröhrenöffnung, die später erweitert werden muss.

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben beschriebenen Risiken gelesen und verstanden habe, und dass ich keine weiteren Fragen mehr habe.

Sehr geehrte Familie ,



Sie haben den Wunsch nach einer Beschneidung aus rituellen Gründen bei Ihrem Sohn, geäußert. Diese Leistung gehört nicht zur vertragsärztlichen Versorgung, da keine Erkrankung vorliegt - gleiches gilt für sämtliche im Zusammenhang dazu erbrachten medizinischen Leistungen. Es besteht jedoch für Sie die Möglichkeit, die Beschneidung als individuelle Gesundheitsleistung in Anspruch zu nehmen. Dazu ist es nötig, dass Sie sich schriftlich mit der Durchführung und den Abrechnungsbedingungen einverstanden erklären.

## **Einverständniserklärung**

Unser Sohn  
wohnhaft  
geb. am  
ist Mitglied bei der

Wir erklären hiermit, dass es unser Wunsch ist, von

Herrn Dr. med. \_\_\_\_\_

## **die Beschneidung**

mitsamt der u. a. unverzichtbaren Begleitleistungen auf privater Abrechnungsbasis zu erhalten:

- Vorbereitung, inkl. Labor,
- Durchführung,
- Nachsorge,

Voraussichtlicher Rechnungsbetrag (bei je 2 klinischen Nachuntersuchungen):

**201,14€\***

\*Da sich die Anzahl der erforderlichen klinischen Nachuntersuchungen (jeweils 27,49€) und der Blutuntersuchungen naturgemäß nach dem postoperativen Verlauf richtet, sind Abweichungen in der Rechnungshöhe möglich.

Für die Durchführung der Narkose wird uns seitens des Narkosearztes eine gesonderte Rechnung zugehen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Abrechnung nach der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ `96) erfolgt. Für Labor-, technische und ärztliche Leistungen kommen die Regelsätze zum Ansatz; die Rechnung wird sofort und komplett fällig.

Ich bin umfassend und zu meiner vollen Zufriedenheit informiert worden.

Wuppertal, den \${#dat}

---

Arzt

## Differenziertes Komplettpaket „Circumcision in Nakose (Kind)“

### Erstberatung

	Ziffer	Leistungstext	Faktor	Betrag€
	1	Beratung	2,3	10,71
	5	Untersuchung, symptombezogen	2,3	10,71
	4	Erhebung der Fremdanamnese	2,3	29,48
		<b>Tagessumme:</b>		<b>50,90</b>

### Op.-Tag :

	Ziffer	Leistungstext	Faktor	Betrag €
	493	Leitungsanästhesie	2,3	8,18
	1741	Circumcision	2,3	49,61
	442	Ambulanzzuschlag, Op. <500	1,0	23,31
	Sachkosten	Sachkosten zu 1741 nach DKG-NT		11,41
	Sachkosten	Lokalanästhesie zu 493 nach DKG-NT		2,85
		<b>Tagessumme Op.-Tag allein:</b>		<b>95,36</b>
		<b>Zwischensumme (Tag 1-3):</b>		<b>146,26</b>

### Nachsorge 1

	1	Beratung auch telefonisch	2,3	10,71
	5	Untersuchung, symptombezogen	2,3	10,71
	200	Verband	2,3	6,02

### Nachsorge 2

	1	Beratung, eingeh. >10 min	2,3	10,71
	5	Untersuchung, symptombezogen	2,3	10,71
	200	Verband	2,3	6,02
		<b>Summe (2 Nachsorgen):</b>		<b>54,88</b>
		<b>Endsumme</b>		<b>201,14</b>

### Zusätzlich fallen die Kosten für die Anästhesieleistung an:

	1	Beratung, eingeh. >10 min	2,3	10,71
	5	Untersuchung, symptombezogen	2,3	10,71
	253	Injektion, intravenös	2,3	9,38
	462	Kombinationsnarkose mit endotrachealer Intubation, bis zu einer Stunde	2,3	68,73
		<b>Summe (Narkose):</b>		<b>99,57</b>
		<b>Endsumme</b>		<b>300,71</b>